

Παράρτημα. Χαρακτηριστικά δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ), Ελλάδα, 2010-2020 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό ΔΝ [σύνολο και με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)], επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ και αριθμός θανάτων σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, Ελλάδα, 2010-2020 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Κρούσματα λοίμωξης από ιό του ΔΝ	Έτος										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Σύνολο κρουσμάτων	262	100	161	86	15	0	0	48	317	227	145
Κρούσματα ΜΕ προσβολή ΚΝΣ (%)	197 (75%)	75 (75%)	109 (68%)	51 (59%)	14 (93%)	0	0	28 (58%)	243 (77%)	140 (62%)	116 (80%)
Επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ (ανά 100.000 πληθ)	1.8	0.7	1.0	0.5	0.1	0	0	0.3	2.2	1.3	1.1
Αριθμός θανάτων	35	9	18	11	6	0	0	5	51	35	23

Πίνακας 2. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά κλινική μορφή νευρο-δισειδυτικής νόσου, Ελλάδα, 2010-2020 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Κλινική μορφή νευρο-δισειδυτικής νόσου	%	Αριθμός κρουσμάτων
Εγκεφαλίτιδα/ Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα	86%	838
Μηνιγγίτιδα	13%	122
Οξεία χαλαρή παράλυση (ΟΧΠ) μόνο	1%	13
ΟΧΠ +/- εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα*	4%*	40*
Σύνολο κρουσμάτων με προσβολή του ΚΝΣ	100%	973

* Συμπεριλαμβάνονται και στις ανωτέρω κατηγορίες.

Πίνακας 3. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά ηλικιακή ομάδα, Ελλάδα, 2010-2020 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Ηλικιακή ομάδα (έτη)	%	Αριθμός κρουσμάτων
<20	2	16
20-29	2	15
30-39	4	37
40-49	4	37
50-59	9	92
60-69	17	170
70-79	34	330
≥80	28	276
Σύνολο	100	973

Πίνακας 4. Ποσοστά (%)* περιστατικών με λοίμωξη από ιό ΔΝ, με και χωρίς προσβολή του ΚΝΣ, ανά αναφερόμενο σύμπτωμα/ σημείο, Ελλάδα, 2010-2020 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Σύμπτωμα (αναφερόμενο)/Σημείο	Περιστατικά ΜΕ προσβολή ΚΝΣ (%)	Περιστατικά ΧΩΡΙΣ προσβολή ΚΝΣ (%)
Πυρετός	99	93
Σύγχυση	76	27
Γενικευμένη αδυναμία/ καταβολή/κόπωση	74	74
Κεφαλαλγία	62	60
Υπνηλία	54	30
Ανορεξία	53	50
Ρίγος	49	45
Διάρροια/ ναυτία/ έμετος	48	48
Αίσθημα ζάλης	39	27
Αρθραλγίες/ μυαλγίες	35	46
Τρόμος/ εξωπυραμидικά συμπτώματα	34	3**
Αστάθεια	30	3**
Εξάνθημα	17	32
Κοιλιακό άλγος	16	21
Παρέσεις/ παραλύσεις	12	0
Οπισθοβολβικός πόνος	12	19
Αιμωδίες	11	7
Θάμβος όρασης	10	4
Διογκωμένοι Λεμφαδένες	4	15

* Τα ποσοστά υπολογίσθηκαν επί των περιστατικών στα οποία ήταν γνωστή η σχετική πληροφορία.

** Σύμπτωμα κατά αναφορά των ίδιων των ασθενών (ή συγγενών τους).

Σε κάθε τυχόν περαιτέρω χρήση των ανωτέρω επιδημιολογικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως αναφέρετε ότι η πηγή τους είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας («Πηγή δεδομένων: ΕΟΔΥ»).